



Overzicht belangrijkste toegelaten gewasbeschermingsmiddelen - aardbeien

Product	Toel. Nr.	W-Code	Glas	Vollegr.	Werkz. Stof	Werking	Dosering	Opmerkingen	Toegel. in mileukeur
Abamectine HF-G	13207N	✗	✓	✓	abamectin (18 G/L)	Spint/Trips	50 ml/100	Niet toepassen tijdens bloei (VT 3 dgn)	Max 3x, driftreductie-eisen
Aliette	11561N	W2	✗	✓	fosetyl-aluminium (80%)	Phytophthora	7,5 kg/ha	Alleen toegelaten onbedekte teelt (VT 14 dgn)	ja
Apollo	8794N	W7	✓	✓	clofentezin (500 G/L)	Spint (eieren/eerste larven)	30 ml/100l	Enkel tot opengaan bloemen en na oogst toepassen	MK-eis driftreductie
Basta 200	8906N	W.9	✗	✓	glufosinaat-ammonium (200 G/L)	Eenjarige tw ee- en eenzaadlobbige	3-5 L/ha	Enkel op tijdelijk onbeteeld land	Ja
Betasane SC	13234 N	w 2	✗	✓	Fenmedifam	Bladherbicide zonder bodem werking.	4-6 ltr per ha	Giftig voor, levende w ater organisme. voor de bloei na de oogst en na uitplanten.Niet toepassen boven 20 C.	ja
Bio 1020	12589N	✗	✓	✓	Metarhizium anisopliae stam FS2	Trips	50-100 kg/ha	Inw erken noodzakelijk, toepassing icm compost geadviseerd	✗
Botanigard	12611N	✗	✓	✗	Beauveria bassiana stam GHA	Witte vlieg (larven)	125 ml/100l	Bestuivers verw ijderen	ja
Calypso	12452N	w 2	✓	✓	thiacloprid (480 G/L)	Witte vlieg / Luis	25 ml/100l	Max. 2 bespuitingen Nevenw . bloesemkever (VT 1 dag)	ja
Cantack	12939N	✗	✓	✓	acequinocyl (164 G/L)	Spint (eieren en bew egelijke stadia)	100 ml/100l	Alleen toegelaten in vermeerdering	ja
Captan 480 SC	12300N	W2	✓	✓	captan 80%	Botrytis/ Colletotrichum / mucor	150gr/100L w ater	Nog max. 2 bespuitingen na begin bloei (onder glas) (VT 4 dgn en 14 dgn onder Glas)	ja
Decis EC	7774N	W11	✓	✓	deltamethrin (25 G/L)	Aardbeibloesem-kever/Trips/Rupsen	20 ml/100l	Max. tot opening eerste bloemen, Niet in comb. met biologische bestrijding (VT 4 dgn.)	MK-eis driftreductie
Dual Gold	12096N	W5	✗	✓	S-metolachloor (960 G/L)	Eenjarige onkruiden	400-600ml/ha	In w achtbedden en productievelden (VT 28 dgn.)	Ja
Envidor	12477N	✗	✓	✓	spirodiclofen (240 G/L)	Spint (alle larven, vrouw elijke volw as)	40 ml/100l	Enkel voor bloei en na oogst toepassen (VT 3 dgn)	Ja mrt-aug
Enzicur	12940N	w 1	✓	✗	kaliunjodide kaliumthiocyanaat	Echte meeldauw	150gr/ 100L w ater	Alleen toegelaten in bedekte teelt (VT 0 dgn)	Ja
Fenmedifam	9390 N	w 2	✗	✓	Fenmedifam	Bladherbicide zonder bodem werking	4-6 ltr per ha.	Giftig voor levende w ater organisme. aardbeien voor de bloei, na de oogst en na uitplanten. Niet toepassen boven 20c.	ja
Fenomenal	12824	w 3	✗	✓	fenamidone 0,6% fosetyl-aluminium 60%	Phytophthora	Dosering afhankelijk van toepassing.	Alleen toegelaten in onbedekte teelt dmv dompel- en aangietbehandeling. Dosering afhankelijk van toepassing.	✗
FinaleSL 14 (1)	10645N	W7	✗	✓	glufosinaat-ammonium (150 G/L)	Eenjarige tw ee- en eenzaadlobbige	3-5 L/ha	Enkel op tijdelijk onbeteeld land	ja
Floramite 240SC	12421N	W2	✓	✓	kaliunthiocyanaat (22 G/KG)	Spint (alle stadia)	40 ml/100l	Max. 1 behandelingsprogramma (*) (VT 1 dag)	MK-eis driftreductie
Frupica (SC)	12221N 12229N	W2	✓	✓	mepanipyrim (440 G/L)	Botrytis/Echte meeldauw	0,9 L/ha	Max. 2 bespuitingen (VT 3 dgn)	ja
Fusilade	12519	W1	✗	✓	fluazifop-P-butyl (125 G/L)	Eenjarige grassen	1-1,25 L/ha	Enkel toepassen voor bloei en na pluk. gevaarlijk voor roofmijten(VT 42 dgn.)	nee
Goltix WG	13050N	✗	✗	✓	metamitron (70 %)	Eenjarige onkruiden	0,5-1 L/ha	Alleen toegelaten voor uitgangsmat. (opkw eek/vermeerdering/w achtbedden) (+)	"Niet in gw bg,
Herbasan SC(2)	12424N	W3	✗	✓	fenmedifam (160 G/L)	Eenjarige tw eezaadlobbige onkruiden	✗	Enkel toepassen voor bloei en na pluk dan wel na uitplanten	ja
Kontakt 320 SC	12899N	W.1	✗	✓	fenmedifam (320 G/L)	Tw eezaadlobbige onkruiden	3 L/ha	Enkel voor de bloei of na de oogst, dan w el na het uitplanten	Ja
Merpan WG	11462N	W6	✓	✓	captan (80%)	Vruchtrot	150gr/100L w ater	Nog max. 2 bespuitingen na begin bloei (onder glas)	Ja
Milbeknock	12364N	W2	✗	✓	milbemectin (1%)	Spint (alle stadia)	50 ml/100l	Enkel voor bloei en na oogst toepassen, let op drifteisen. Schadelijk voor roofmijten	ja

Product	Toel. Nr.	W-Code	Glas	Vollegr.	Werkz. Stof	Werking	Dosering	Opmerkingen	Toegel. in mileukeur
Monam	6321N	W10	✗	✓	metam-natrium (510 G/L)	Aaltjes	6-7,5L/are	Max. 1x per 5 jaar, enkel in de periode van 16 maart tot en met 15 november	Nee
Nimrod	6834N	W11	✗	✓	bupirimaat (250 G/L)	Echte meeldauw	1 L/ha	Max. 3 bespuitingen. alleen in vollegrond (VT 3 dgn)	ja
Nissorun	9704N	W5	✓	✓	hexythiazox (10%)	Spint (eieren en alle larvestadia)	50 gr/100l	VT 3 dgn.	ja
Oberon	12588N	W3	✓	✓	spiromesifen (240 G/L)	Witte vlieg / Spint	50 ml/100l	Toegelaten van 1 sep. tot 1 mrt. max. 2 bespuitingen, niet toepassen in grondwaterbeschermingsgeb (VT 1 dag)	ja
Panic(3)	12639N	✗	✗	✓	glyfosaat (360 G/L)	Diverse onkruiden	2 L/ha	Enkel op tijdelijk onbeteeld land in combinatie met Kantor	ja
Paraat	11432N	W6	✓	✓	dimethomorf (50%)	Phytophthora	3 kg /ha	Onder glas alleen via voedingsoplossing toedienen (VT 35 dgn)	ja
Pijpzw avel	✗	✗	✓	✗	zw avel	Meeldauw	✗	verdampen dmv verdamper	ja
Pilot	12279N	✗	✗	✓	quizalofop-P-ethyl (50 G/L)	Eenjarige grassen/ Graanopslag	1 L/ha	I.v.m. gew asveiligheid geen uitvloeiers gebruiken (VT 30 dgn.)	Ja
Pirimor	5794N	W3	✓	✓	pirimcarb (50%)	Luis	50 gr/100l	VT 7 dgn.	MK-eis driftreductie
Pirimor rooktontw.	5793N	W2	✓	✗	pirimcarb (10%)	Luis	1st/700 mÅ³	VT 7 dgn.	MK-eis driftreductie
Round-up Max	12545N	✗	✗	✓	glyfosaat (450 G/L)	Diverse onkruiden	1,5-3 L/ha	Enkel op tijdelijk onbeteeld land	Ja
Rovral Aquaflo.	8928N	W23	✓	✓	iprodion (500 G/L)	Botrytis	2kg/ha	Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgeb. Percelen aan oppervlaktew. uitsluitend spuiten met spuitdop uit cat. 75% (VT 35 dgn)	"Niet in gw bg
Scala	11555N	W3	✓	✓	pyrimethanil (400 G/L)	Botrytis	2 L/ha	Max. 2 bespuitingen met interval van min. 7 dagen (VT 3 dgn)	Ja mrt-aug
Signum	12630N	W7	✓	✓	boscalid (26,7%) pyraclostrobin (6,7%)	Botrytis / Meeldauw	1,8 kg/ha	Max. 2 bespuitingen (VT 1 dgn)	ja
Spruzit	7229N	W3	✓	✓	pyrethrinen (40 G/L) piperonylbutoxide (160 G/L)	Bijtende en zuigende insecten	1 l/ha	Niet toepassen tijdens bloei (VT 2 dgn.)	nee
Spuit-zw avel	10123N	W2	✗	✓	zw avel	Meeldauw	✗	Enkel voor en na oogst toepassen	ja
Stroby WG	11818N	W2	✓	✓	kresoxim-methyl (50%)	Meeldauw	0,3 kg/ha	max 2 bespuitingen (VT 7 dgn)	Ja mrt-aug
Sw itch	12819N	W2	✓	✓	fludioxonil (25%) cyprodinil (37,5%)	Botrytis / Colletotrichum	1 kg/ha	Max. 3 bespuitingen. Percelen aan oppervlaktew. spuiten met spuitdop uit cat. 75% (VT 1 dag)	"MK-eis driftred. B alleen bedekte niet
Teldor	12130N	W4	✓	✓	fenhexamide (50%)	Botrytis	1,5 kg/ha	VT 1 dag	ja
Thiram Granuflo	10172N	W9	✓	✗	thiram (80%)	Botrytis	200-250gr/100L water	Glas: gebruik toegestaan tot opengaan eerste bloemen. (VT 14 dgn)	nee
Topaz	9364N	W.7	✓	✓	penconazole	Meeldauw	0,5 L/ha	Niet in grondwaterbeschermingsgebieden Maximaal 4 X (VT Å 3 dgn)	✗
Torque L	7037N	W4	✓	✗	fenbutatinoxide (550 G/L)	Spint	45 ml/100l	Niet in grondgebonden teelten Enkel voor bloei en na oogst toepassen	nee
Turex	11702N	W2	✓	✓	Bacillus thuringiensis (25000 IU/MG)	Rupsen van koolmot en gamma-uil	✗	Bacteriepreparaat (VT 7 dgn.)	ja
Vertimec Gold	13087N	W7	✓	✓	abamectin (18 G/L)	Spint/Trips	50 ml/100	Niet toepassen tijdens bloei (VT 3 dgn.)	"Max 3x,
Vydate -	12409N	W6	✗	✓	oxamyl (10%)	Aaltjes	40 kg/ha	Inw erken noodzakelijk, uitsluitend op vermeerderingsvelden	Nee
Xen Tari	12437N	✗	✓	✓	Bacillus thuringiensis 15000 IU/MG	Rupsen van koolmot en gamma-uil	1 kg/ha	Bacteriepreparaat (VT 7 dgn.)	ja

Toevoeging aan gegeven opmerkingen:

(*) een behandelingsprogramma bestaat uit een enkele bespuiting, of uit 2 bespuitingen met een interval van 7 dagen

(+) gebruik van dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in de Wet bodembescherming, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden, is niet toegestaan op gronden met een organische stofgehalte minder dan 2% en minder dan 10% afslibbaar

Belangrijkste vergelijkbare producten (enkel op basis van werkzame stof) zijn:

(1) Basta 200, Budget Glufosinaat-Ammonium 150 SL, Radicale 2

(2) Agrichem Fenmedifam, Akopham 320 SC, Kontakt 320 SC

(3) Er zijn veel producten verkrijgbaar op basis van de werkzame stof glyfosaat o.a. Roudup Max, Touchdown Quattro.

Deze lijst is onder voorbehoud van wijzigingen door CTGB en is bijgewerkt tot april 2012. Deze lijst geeft gangbare middelen voor de Nederlandse teelt weer en mag niet als 100% volledig worden beschouwd. Lees voor gebruik van een betreffend middel ten alle tijden het etiket. Telermaat stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van deze lijst